

Colisorb® vet.

Vaksine mot E. coliinfeksjon og rødsyke hos gris.

INJEKSJONSVÆSKE:

Hver dose (2 ml) inneh.: $4,2 \times 10^8$ formalindrepte celler av følgende E. coli bakteriestammer: O8:K87,K88ab, O8:K87,K88ac, O45:K«E65»,K88ac, O64:K«V142», O138:K81, O139:K82, O141:K85ac, O141:K85ab,K88ab, O147:K88ac,K89, O149:K88ac, K91 (Abbotstown), O149:K88ac,K91 (A1), O157:K88ac, K«V17» og følgende konsentrasjon av oppløselige E. coli antigener: K88ab og K88ac min. 32 HAE, K99 min. 100 HAE, 987P min. 0,3 µg, LTB min. 0,2 µg. Min. $6,6 \times 10^8$ bakterieantigener av følgende Erysipelothrix rhusiopathiae stammer: P15/10 (serotype 1), CN3342 (serotype 2) og CN3461 (serotype 2). Aluminiumhydroksid 21 mg, trometamol 4,84 mg, maleinsyre 4,64 mg, natriumklorid 17 mg, formaldehyd maks. 1 mg, tiomersal 0,26 mg og vann til injeksjon til 2 ml.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Forebygger rødsykeinfeksjon og spedgrisdiaré forårsaket av Erysipelothrix rhusiopathiae og E. coli.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av gris mot rødsyke (Erysipelothrix rhusiopathiae). Passiv immunisering av spedgris, via kolostrum fra vaksinerte mordyr, mot rødsyke og mot spedgrisdiaré forårsaket av E. coli.

Kontraindikasjoner:

Syke og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand.

Bivirkninger:

Forbigående hevelse på injeksjonsstedet, kortvarig temperaturstigning og overømfintlighetsreaksjoner kan forekomme.

Forsiktighetsregler:

Unngå stressituasjoner i forbindelse med vaksinasjon. Dyr i en inkubasjonsfase kan vise sykdomstegn etter vaksinasjon. Bytt kanyler ofte ved flokkbehandling.

Interaksjoner:

For å unngå mulig interferens bør det gå minst 2 uker før en vaksinerer etter applikasjon av rødsykeserum. For å oppnå tilfredsstillende immunrespons, bør immunsuppressive legemidler ikke brukes like før eller etter vaksinerer.

Drektighet/Laktasjon:

Vaksinen skal anvendes til drektige dyr.

Dosering:

1 dose er 2 ml. Vaksinen appliseres subkutant. Rist flasken før bruk. *Grunnimmunisering:* 2 injeksjoner med 3 ukers intervall. Siste injeksjon gis 3 uker før forventet grising. *Revaksinering:* 1 injeksjon gis 3 uker før hver forventet grising.

Overdosering/Forgiftning:

Forsøk med inngift av dobbel dose til drektige purker har ikke ført til andre reaksjoner enn forbigående smerteløs hevelse på injeksjonsstedet.

Tilbakeholdelsestider:

Ingen. Ved slaktning innen 2 uker skal injeksjonsstedet kasseres.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares kaldt, men frostfritt (2–8°C). Anbrudt pakning bør anvendes samme dag.

Andre opplysninger:

Oppsøk lege dersom selvinjeksjon medfører lokale eller systemiske reaksjoner.

Pakninger:

20 ml, 50 ml.