

Neocolipor vet.

Vaksine mot Escherichia coli for spedgris.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 2 ml inneh.: E. coli rekombinante stammer adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad) minimum 2,1 SA.U, E. coli rekombinant stamme adhesin F5 minimum 1,7 SA.U, E. coli feltstamme adhesin F6 minimum 1,4 SA.U, E. coli feltstamme adhesin F41 minimum 1,7 SA.U, aluminiumhydroksid 1,4 mg, tiomersal 0,2 mg.

Egenskaper: Klassifisering: Inaktiverte stammer av E. coli som forårsaker neonatal enterotoksemi hos spedgris. Virkningsmekanisme: Hos vaksinerte purker og ungpurker induserer vaksinen spesifikk serokonversjon. Spedgris immuniseres passivt via kolostrum og melk inneholdende adhesinspesifikke antistoff.

Indikasjoner: Reduksjon av neonatal enterotoksemi hos spedgris i løpet av deres første levedøgn, forårsaket av E.coli-stammer som uttrykker adhesinene F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 og F41.

Bivirkninger: Vaksinering kan forårsake mild hypertermi (<1,5°C i løpet av de første 24 timer).

Forsiktighetsregler: Vaksiner kun friske dyr. Administreres ikke sammen med andre legemidler. Kontroller at hver spedgris tar til seg tilstrekkelig mengde kolostrum i løpet av 6 timer etter fødselen, ettersom spedgrisene får sin beskyttelse via dette inntaket.

Dosering: Omristes før bruk. 1 dose (2 ml) gis intramuskulært i nakken bak øret. Grunnvaksinasjon: 1. injeksjon gis 5-7 uker før grising, 2. injeksjon gis 2 uker før grising. Revaksinering: 1 injeksjon 2 uker før hver påfølgende grising.

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares mørkt og kaldt, men frostfritt (2-8°C).

Andre opplysninger: Ved uhell med injeksjon på menneske bør lege kontaktes.

Pakninger: 10 ml. 50 ml.