

# Parvoruvax vet.

*Vaksine mot rødsyke og svineparvovirusinfeksjon.*

INJEKSJONSVÆSKE: 1 dose (2 ml) inneh.: Inaktivert svineparvovirus min. 102 HAI.U, Erysipelothrix rhusiopathiae (lyserte bakterieceller) serotype 2 min. 50 IU adsorbent til aluminumhydroksid, tiomersal 0,2 mg, natriumkloridoppløsning 8,5 mg/ml til 2 ml.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Induserer immunitet mot Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 1a, 1b og 2 og porkint parvovirus. Beskyttende immunitet oppnås vanligvis 3 uker etter grunnimmuniseringen.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av svin mot svineparvovirusinfeksjon og rødsyke.

Kontraindikasjoner: Syke dyr og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand. Purker skal ikke vaksineres de første 3 ukene etter bedekning.

Bivirkninger: Lokal, forbigående hevelse på injeksjonsstedet. Hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme.

Interaksjoner: Maternell immunitet mot porkint parvovirus kan forstyrre antistoffdannelsen opptil 6 måneders alder.

Dosering: Vaksinen ristes før administrering. 2 ml (1 dose) gis dypt intramuskulært i nakken bak øret. Grunnimmunisering: 2 vaksinasjoner med 3-4 ukers intervall før bedekning. 1. dose bør ikke gis før 6 måneders alder pga. mulig interferens med maternale antistoffer. 2. dose kan gis inntil 1 uke før bedekning. Revaksinering: 1 vaksinasjon hver 6. måned. Purker vaksineres uken før avvenning.

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap).

Pakninger: 10 ml. 10 × 10 ml. 50 ml. 10 × 50 ml.