

Porcilis Ery vet.

Rødsykevaksine.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (2 ml) inneh.: Erysipelothrix rhusiopathiae stamme M2 (serotype 2) inaktivert lysert antigenkonsentrat ≥ 1 ppd, dl- α -tokoferolacetat 150 mg og formaldehyd 0,02-0,05%.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Beskyttelse mot rødsyke oppnås innen 3 uker og varer i 6 måneder.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av svin for å redusere kliniske symptomer på rødsyke forårsaket av alle relevante Erysipelothrix rhusiopathiae serotyper (serotype 1 og 2).

Bivirkninger: Lett, forbigående økt kroppstemperatur (0,5°C) innen 24 timer, forbigående liten lokal hevelse (1-10 mm) inntil 8 dager etter vaksinerings og noe motvillighet til å bevege seg og til å spise.

Forsiktighetsregler: Syke og svake dyr skal ikke vaksineres.

Interaksjoner: Ingen andre vaksiner anbefales gitt 14 dager før til 14 dager etter vaksinerings.

Dosering: 1 dose er 2 ml. Vaksinen injiseres dypt i.m. bak øret. Omrystes godt før og under bruk. Grunnimmunisering: 2 ml fra 10 ukers alder. Vaksinasjonen foretas 2 ganger med 4 ukers mellomrom. Revaksinerings: 2 ganger årlig.

Tilbakeholdelsestider: 0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2-8°C) og mørkt. Må ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd: 10 timer.

Pakninger: 20 ml.