

Porcilis Glässer vet.

Vaksine mot Glässers sykdom hos svin.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (2 ml) inneh.: Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen (induserer $\geq 9,1$ ELISA-enheter) inaktiverede bakterieceller, dl- α -tokoferolacetat 150 mg.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer utvikling av immunitet mot Haemophilus parasuis serotype 5, som er den mest prevalente av de virulente H. parasuis serotypene. Delvis beskyttelse mot de andre virulente serotypene. Begynnende immunitet 2 uker etter fullført vaksinasjon. Immuniteten varer i 14 uker etter fullført vaksinasjon. Vaksinen er til nytte når dyr uten eller med lave antistoffnivåer mot H. parasuis serotype 5 kommer sammen med griser fra eller i omgivelser med høyere prevalens av Glässers sykdom. Kontroll av Glässers sykdom avhenger også av optimalisering av miljøfaktorer.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av gris for å redusere typiske lesjoner ved Glässers sykdom forårsaket av Haemophilus parasuis serotype 5.

Bivirkninger: Forbigående temperaturstigning ($\leq 2^{\circ}\text{C}$) og nedsatt aktivitet, depresjon og oppkast på vaksinasjonsdagen. Restitusjon neste dag. Lokale reaksjoner (smertefrie rødlige hevelser på 2,5-7,5 cm) hos noen griser inntil 3 dager etter vaksinasjon.

Forsiktighetsregler: Bare friske dyr skal vaksineres.

Interaksjoner: Andre vaksiner bør ikke gis 14 dager før til 14 dager etter vaksinerings.

Drektighet/Laktasjon: Bruk er ikke anbefalt under drektighet og laktasjon, da slik bruk ikke er undersøkt.

Dosering: 1 dose (2 ml) injiseres intramuskulært i nakken. Vaksinen skal ha værelsetemperatur før bruk. Omrystes før og under bruk. Vaksinasjonsprogram: Minst 5 uker gamle griser vaksineres 2 ganger med 2 ukers mellomrom.

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt ($2-8^{\circ}\text{C}$). Må ikke fryses. Brukes umiddelbart etter anbrudd.

Pakninger: 50 ml.