

Porcovac® Plus vet.

Inaktivert vaksine mot *E. coli*infeksjon hos gris.

INJEKSJONSVÆSKE:

Hver dose (2 ml) inneh.: $4,2 \times 10^8$ formalindrepte celler av følgende *E. coli* bakteriestammer: O8: K87,K88ab, O8: K87,K88ac, O45:K«E65»,K88ac, O64:K«V142», O138:K81, O139:K82, O141:K85ac, O141:K85ab,K88ab, O147:K88ac,K89, O149:K88ac, K91 (Abbotstown), O149:K88ac,K91 (A1), O157:K88ac, K«V17» og følgende konsentrasjon av oppløselige *E. coli* antigener: «K88ab» og «K88ac» min. 32 HAE, «K99» min. 100 HAE, «987P» min. 0,3 µg, «LTB» min. 0,2 µg. Aluminiumhydroksid 21 mg, trometamol 4,84 mg, maleinsyre 4,64 mg, natriumklorid 17 mg, formaldehyd maks. 1 mg, tiomersal 0,26 mg og vann til injeksjon til 2 ml.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Brukes til å forebygge spedgrisdiaaré forårsaket av *E. coli*. Vaksinerte dyr viser titerstigning etter ca. 2 uker. Det sees også høye antistofftitre i kolostrum hos purker som er vaksinerte i henhold til anbefalt doseregime. Grisunger etter vaksinerte purker oppnår passiv immunitet via kolostrum.

Indikasjoner:

Passiv immunisering av spedgris, via kolostrum fra vaksinerte ungpurker og purker, mot spedgrisdiaaré forårsaket av *E. coli*.

Kontraindikasjoner:

Syke og/eller dyr med dårlig ernæringstilstand.

Bivirkninger:

Forbigående hevelse på injeksjonsstedet, kortvarig temperaturstigning og overømfintlighetsreaksjoner kan forekomme.

Forsiktighetsregler:

Unngå stress-situasjoner i forbindelse med vaksinasjon. Dyr i inkubasjonsfasen kan vise sykdomstegn etter vaksinasjon. Bytt kanyler ofte ved flokkbehandling.

Interaksjoner:

For å oppnå tilfredsstillende immunrespons, bør immunsuppressive legemidler ikke brukes like før eller etter vaksineringsen.

Drektighet/Laktasjon:

Vaksinen brukes til drektige purker.

Dosering:

1 dose er 2 ml. Vaksinen appliseres subkutant. Rist flasken før bruk. **Grunnimmunisering:** 2 injeksjoner gis med 3 ukers intervall, siste injeksjon gis 3–4 uker før grising. **Revaksinering:** 1 injeksjon gis 3–4 uker før hver grising.

Overdosering/Forgiftning:

Forsøk med inngift av dobbel dose til drektige purker har ikke ført til andre reaksjoner enn forbigående smerteløs hevelse på injeksjonsstedet.

Tilbakeholdelsestider:

Ingen. Ved slaktning innen 2 uker skal injeksjonsstedet kasseres.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares kaldt, men frostfritt (2–8°C). Anbrudte pakninger må brukes innen 24 timer pga. fare for kontaminering etter innstikk.

Andre opplysninger:

Oppsøk lege ved ev. selvinjeksjon, som kan medføre sterke lokale og ev. systemiske reaksjoner hos vaksinatøren.

Pakninger:

20 ml, 10 × 20 ml.