

Duvaxyn Plus vet.

Vaksine mot influensa og stivkrampe hos hest.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (1,5 ml) inneh.: Influenza A/equi 1/Prag-56 15-18 µg HA, influensa A/equi 2/Newmarket 1/93 15-18 µg HA, influensa A/equi 2/Suffolk-89 15-18 µg HA, tetanustoksoid 15-18 Lf., karbomer 934P 4 mg, aluminiumhydroksid 2,2 mg, oppløsningsvæske til 1,5 ml.

Egenskaper: Klassifisering: Gir en aktiv immunitet mot sykdom forårsaket av influensavirus (H7N7 og H3N8), inkl. H3N8 South Africa/4/03. Stimulerer immunitet mot Clostridium tetani-toksin. Inneholder 3 inaktiverte hesteinfluensavirusstammer og rensset tetanustoksoid. Beskyttende immunitet oppnås 2 uker etter grunnvaksinering. Etter andre dose varer immuniteten i minst 6 måneder, og etter tredje dose og ettefølgende revaksinasjoner minst 1 år, og mot tetanus minst 2 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hest mot hesteinfluenza og stivkrampe.

Kontraindikasjoner: Vaksinerer av syke og påkjente dyr.

Bivirkninger: Forbigående lokale reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme.

Forsiktighetsregler: Unngå stress ved vaksineringsstidspunktet. Hester som vaksineres bør ikke utsettes for ekstra påkjenninger som løp, hard trening og lange transporter o.l. de første 10 døgn etter vaksinasjonen.

Drektighet/Laktasjon: Kan gis til drektige og lakterende hopper. Bør bare brukes på drektige hopper som er blitt grunnvaksinert før drektighet.

Dosering: 1 dose = 1,5 ml. Vaksinen omrystes før bruk og settes dypt intramuskulært. Grunnvaksinering: 1. og 2. injeksjon gis med 4-6 ukers mellomrom. 3. injeksjon gis etter 6 måneder. Føll vaksineres første gang ved 5-måneders alder. Revaksinerer: Revaksinerer mot hesteinfluenza minst hver 12. måned. Revaksinerer mot tetanus annethvert år.

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Kaldt ved 2-8°C. Unngå frost, varme og/eller sterkt sollys.

Pakninger: Hettegl.: 10 stk.