

Duvaxyn vet.

Vaksine mot influensa hos hest.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (1 ml) inneh.: Influenza A/equi 1/Prag-56 15-18 µg HA, influensa A/equi 2/Newmarket 1/93 15-18 µg HA, influensa A/equi 2/Suffolk-89 15-18 µg HA, karbomer 934P 4 mg, aluminiumhydroksid 2,2 mg, oppløsningsvæske til 1,5 ml.

Egenskaper: Klassifisering: Gir en aktiv immunitet mot sykdom forårsaket av influensavirus (H7N7 og H3N8), inkl. H3N8 South Africa/4/03. Inneholder 3 inaktiverede hesteinfluensavirusstammer. Beskyttende immunitet oppnås 2 uker etter grunnvaksinering. Etter andre dose varer immuniteten minst 6 måneder, og etter tredje dose og etterfølgende revaksinasjoner, i minst 1 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hest mot hesteinfluenza.

Kontraindikasjoner: Vaksinerings av syke eller påkjente dyr.

Bivirkninger: Forbigående lokale reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme.

Forsiktighetsregler: Unngå stress ved vaksineringsstidspunktet. Hester som vaksineres bør ikke utsettes for ekstra påkjenninger som løp, hard trening og lange transporter o.l. de første 10 døgn etter vaksinasjonen.

Drektighet/Laktasjon: Kan gis til drektige og lakterende hopper. Bør bare brukes på drektige hopper som er blitt grunnvaksinert før drektighet.

Dosering: 1 dose = 1 ml. Vaksinen omrystes før bruk og settes dypt intramuskulært. Grunnvaksinasjon: 1. og 2. injeksjon gis med 4-6 ukers mellomrom. 3. injeksjon gis etter 6 måneder. Føll vaksineres første gang ved 5-måneders alder. Revaksinerings: Minst hver 12. måned.

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Unngå frost, varme og/eller sterkt sollys.

Pakninger: Hettegl.: 10 stk.