

# Equilis Prequenza

*Vaksine mot influensa hos hest.*

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (1 ml) inneh.: Subenheter av rensset haemagglutinin fra ekvine influensavirus: A/equine-1/Prague/1/56 100 AU, A/equine-2/Newmarket/1/93 50 AU, A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AU, rensset saponin 375 mikrog., kolestrol 125 mikrog., fosfatidylkolin 62,5 mikrog., spor av tiomersal.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot hesteinfluensa.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot hesteinfluensa, ved å redusere kliniske symptomer og virusspredning etter infeksjon. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 5 måneder etter grunnimmunisering, 12 måneder etter 1. revaksinerings.

Bivirkninger: En diffus hard eller bløt hevelse (maks. 5 cm i diameter), som går tilbake innen 2 dager, kan forekomme. Smerte på injeksjonsstedet kan av og til forekomme. Feber kan i noen tilfeller forekomme i 1 dag, unntaksvis i 3 dager.

Forsiktighetsregler: Pga. mulig interferens med maternelle antistoffer, skal føll ikke vaksineres før ved 6 måneders alder, spesielt føll født av hopper som ble revaksinert i løpet av de 2 siste månedene av drektigheten.

Interaksjoner: Det anbefales at ingen andre vaksiner gis samtidig med dette preparatet.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering: Kun friske dyr skal vaksineres. 1 dose (1 ml) gis i.m. Grunnimmunisering: 1. injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinerings: 1. revaksinerings (3. dose) gis 5 måneder etter grunnimmuniseringen. Denne revaksinerings fører til immunitet som varer i minst 12 måneder. Den 2. revaksinerings gis 12 måneder etter 1. revaksinerings. Alternativt anbefales det å gi, med 12 måneders intervall, en passende vaksine mot hesteinfluensa som inneholder stammene A/Equi 1/Prague 56, A/Equi 2/Newmarket-1/93 og A/Equi 2/Newmarket-2/93, for å opprettholde immunitet for influensakomponenten. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 måneders alder og 4 uker senere).

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Må ikke fryses.

Pakninger: Ferdigfylte sprøyter: 10 × 1 ml.