

# Equilis Prequenza Te

*Vaksine mot influensa og tetanus hos hest.*

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (1 ml) inneh.: Tetanustoksoid og subenheter av rensset haemagglutinin fra ekvine influensavirus: A/equine-1/Prague/1/56 100 AU, A/equine-2/Newmarket/1/93 50 AU, A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AU, tetanustoksoid 40 Lf, rensset saponin 375 mikrog., kolestrol 125 mikrog., fosfatidylkolin 62,5 mikrog., spor av tiomersal og formaldehyd.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunisering mot hesteinfluensa, og aktiv immunisering mot tetanus.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hester fra 6 måneders alder mot hesteinfluensa, ved å redusere kliniske symptomer og virusspredning etter infeksjon, og aktiv immunisering mot tetanus for å hindre dødsfall. Influensa: Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 5 måneder etter grunnimmunisering, 12 måneder etter 1. revaksinering. Tetanus: Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering. Varighet av immunitet: 17 måneder etter grunnimmunisering, 24 måneder etter 1. revaksinering.

Bivirkninger: En diffus hard eller bløt hevelse (maks. 5 cm i diameter), som går tilbake innen 2 dager, kan forekomme. Smerte på injeksjonsstedet kan av og til forekomme. Feber kan i noen tilfeller forekomme i 1 dag, unntaksvis i 3 dager.

Forsiktighetsregler: Pga. mulig interferens med maternelle antistoffer, skal føll ikke vaksineres før ved 6 måneders alder, spesielt føll født av hopper som ble revaksinert i løpet av de 2 siste månedene av drektigheten.

Interaksjoner: Sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av Tetanus-Serum fra Intervet er vist. Det anbefales at ingen andre vaksiner gis samtidig med dette preparatet.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering: Kun friske dyr skal vaksineres. 1 dose (1 ml) gis i.m. Grunnimmunisering: Første injeksjon gis fra 6 måneders alder, 2. injeksjon gis 4 uker senere. Revaksinering: Influensa: 1. revaksinering (3. dose) gis 5 måneder etter grunnimmuniseringen. Denne revaksineringen fører til immunitet som varer i minst 12 måneder. Den 2. revaksineringen gis 12 måneder etter 1. revaksinering. Alternativt anbefales det å gi, med 12 måneders intervall, en passende vaksine mot hesteinfluensa som inneholder stammene A/Equi 1/Prague 56, A/Equi 2/Newmarket-1/93 og A/Equi 2/Newmarket-2/93, for å opprettholde immunitet for influensakomponenten. Tetanus: 1. revaksinering gis senest 17 måneder etter grunnimmuniseringen. Deretter anbefales et maks. intervall på 2 år. Ved økt infeksjonsrisiko eller ved utilstrekkelig inntak av kolostrum, kan det i tillegg gis en initial injeksjon ved 4 måneders alder etterfulgt av det fullstendige vaksinasjonsprogrammet (grunnimmunisering ved 6 måneders alder og 4 uker senere). Samtidig aktiv og passiv immunisering (krisevaksinering): Vaksinen kan brukes sammen med Tetanus-Serum fra Intervet til behandling av skadede hester som ikke er immunisert mot tetanus. I slikt tilfelle kan den 1. vaksinedosen gis samtidig med egnet profylaktisk dose Tetanus-Serum fra Intervet, på et separat injeksjonssted, ved bruk av separate sprøyter og kanyler. Dette fører til passiv beskyttelse mot tetanus i minst 21 dager etter samtidig administrering. Den 2. vaksinedosen administreres 4 uker senere. En 3. vaksinasjon med Equilis Prequenza Te gjentas minst 4 uker senere. Samtidig bruk av Equilis Prequenza Te og Tetanus-Serum fra Intervet, kan redusere aktiv immunitet mot tetanus sammenlignet med hester som er vaksinert med Equilis Prequenza Te, uten tetanus-antitoksin-serum.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Må ikke fryses.

Pakninger: Ferdigfylte sprøyter: 10 × 1 ml.

Sist endret