

# Equilis® Pro T vet.

Vaksine mot influensa og stivkrampe hos hest.

---

## INJEKSJONSVÆSKE:

1 dose (2 ml) inneholder: Renset antigen fra følgende inaktiverte hesteinfluensavirus: A/Equi 1/Prag/1/56 50 µg HA, A/Equi 2/Newmarket 1/93 20 µg HA, A/Equi 2/Newmarket 2/93 20 µg HA, rensede tetanustoksoid 150 IE, aluminiumhydroksid 9 mg, natriumtimerfonat 0,02 mg, formaldehyd maks. 0,4 mg, fosfatbufret oppløsning (pH 7,2) til 2 ml.

## Egenskaper:

*Virkningsmekanisme:* Vaksinen stimulerer til aktiv immunitet overfor hesteinfluensavirus og tetanus. Antistofftiter mot hesteinfluensavirus når sitt maksimum ca. 2 uker etter 2. vaksinasjon i grunnimmuniseringsprogrammet. Kort tid etter 3. vaksinasjon oppnås ny topp i antistoffkonsentrasjonen. Immunitet etter basisvaksinasjon varer i minst 12 måneder. Beskyttelse mot tetanus oppnås etter 2. vaksinasjon. Etter 3. vaksinasjon varer den beskyttende effekten i ca. 3 år.

## Indikasjoner:

Aktiv immunisering av hest mot hesteinfluensa og tetanus.

## Kontraindikasjoner:

Rutinemessig vaksinasjon skal ikke skje umiddelbart etter hardt fysisk arbeid. Sykdom av enhver art eller dårlig ernæringsstatus hemmer immunsystemet. Kun friske dyr skal vaksineres.

## Bivirkninger:

Forbigående hevelse ved injeksjonsstedet forårsaket av hjelpestoffene. Hypersensitivitetsreaksjoner.

## Forsiktighetsregler:

Ved vaksinasjon av subklinisk infiserte hester, eller av hester i inkubasjonsfase, kan fenomenet «vaksinasjonsprovosert sykdom» ikke utelukkes. Sterk fysisk aktivitet bør unngås de første 2–3 dager etter vaksinasjonen.

## Interaksjoner:

Immunosuppressive legemidler skal ikke anvendes like før eller etter vaksinasjonen, da en tilfredsstillende immunrespons bare oppnås hos immunkompetente dyr. Annen vaksineringsbør gjøres 14 dager før eller etter vaksinasjon med Equilis Pro T vet.

## Drektighet/Laktasjon:

Drektige og lakterende hopper kan vaksineres.

## Dosering:

1 dose er 2 ml. Gis intramuskulært. *Grunnimmunisering:* 1. vaksinasjon kan gjøres fra 4. levemåned. 2. vaksinasjon gjøres 4–6 uker senere. 3. vaksinasjon gjøres 5–7 måneder etter 2. vaksinasjon. *Revaksinerings:* Mot hesteinfluensa med 6–12 måneders intervall med monovaksine. Mot tetanus med 3 års intervall med kombinasjonsvaksine eller monovaksine.

## Tilbakeholdelsestider:

Ingen.

## Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares kaldt (2–8°C). Må ikke fryses.

## Pakninger:

5 x 2 ml, 10 x 2 ml.