

# Duramune DAPPi + LC vet.

*Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirusinfeksjon, parainfluenza, coronavirusinfeksjon og leptospirose hos hund.*

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Onderstepoort, 102,5-104,8 TCID50, hepatittvirus (CAV2), levende svekket stamme V197, 103,6-107,0 TCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme SAH, 104,7-106,5 TCID50, parainfluenzavirus (CPiV), levende svekket stamme FDL, 104,6-107,4 TCID50, stabilitetsmedium til 1 dose. II) Hetteglass: Coronavirus, inaktivert stamme TN449, RP 1,0-2,0, *Leptospira interrogans*, inaktivert lag av yttermembran, serogruppe canicola, serovar canicola, styrke ref. Ph. Eur., *Leptospira interrogans*, inaktivert lag av yttermembran, serogruppe icterohaemorrhagiae, serovar icterohaemorrhagiae, styrke ref. Ph. Eur., etylenmaleatanhydrid (EMA) 0,01 ml, neocryl XK-62 0,03 ml, medium til 1 ml.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot valpesykevirus (CDV), hepatittvirus (CAV2), parvovirus (CPV), parainfluenzavirus (CPiV), coronavirus, *Leptospira interrogans* serogruppe canicola og *Leptospira interrogans* serogruppe icterohaemorrhagiae. Immunitet inntreffer fra 2 uker etter andre vaksinasjon. Varigheten av immuniteten er minst ett år for alle antigenene unntatt parainfluenza, som kan være kortere enn 1 år.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hund mot valpesyke, smittsom hepatitt, parvovirusinfeksjon, parainfluenza, coronavirusinfeksjon og leptospirose.

Bivirkninger: Hevelse på injeksjonsstedet i noen dager etter vaksinasjon.

Forsiktighetsregler: Maternelle antistoffer kan redusere effekten av valpesyke, hepatitt- og parvoviruskomponentene. Denne vaksinen er imidlertid vist å være effektiv ved de nivåer av maternelle antistoffer mot valpesykevirus, hepatittvirus og parvovirus som forekommer i praksis. I tilfelle hvor høye nivåer av maternelle antistoffer er forventet, bør vaksinasjonsprogrammet tilpasses.

Interaksjoner: Det foreligger ingen informasjon om sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor ikke å vaksinere med andre vaksiner samtidig med eller i sammenheng med denne vaksinen.

Dosering: Gis subkutan til hunder fra 6 ukers alder. Grunnimmunisering: Valper 6-10 uker: Første dose mellom 6-8 ukers alder, andre dose fra 10 ukers alder. Valper minst 10 uker gamle: 2 doser med 2-4 ukers intervall. Revaksineringsprogram: En gang årlig anbefales. Ved høyt smittepress for parainfluenza kan årlig revaksineringsprogram være utilstrekkelig.

Overdosering/Forgiftning: Forbigående slapphet ca. 4 timer etter vaksinasjon, som går over etter et par dager. Av og til en liten hevelse på injeksjonsstedet.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger: 25 sett.