

Leptodog vet.

Vaksine mot leptospirose.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: Hver dose (1 ml) inneh.: Inaktivert *Leptospira interrogans* serovar *canicola* og *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae*.

Egenskaper: Klassifisering: Inaktivert leptospiravaksine. Virkningsmekanisme: Stimulering av aktiv immunitet i hunder mot *Leptospira interrogans* serovar *canicola* og *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae*. Serokonvertering er ufullstendig blant de vaksinerte hundene 14 dager etter vaksinasjon. Tilstedeværelse av målbare antistoffnivåer er av relativ kort varighet. Vaksinerte hunder uten målbare antistoffnivåer var beskyttet mot dødelighet og hadde reduserte kliniske symptomer i smitteforsøk.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av hund mot leptospirose for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av *Leptospira interrogans* serovar *canicola* og *Leptospira interrogans* serovar *icterohaemorrhagiae*.

Bivirkninger: Forbigående lokal reaksjon (hevelse), hypertermi eller anafylaktisk sjokk kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. Hypersensitivitetsreaksjoner som f.eks. angioødem og urticaria kan forekomme unntaksvis.

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr skal vaksineres. Hunden bør ikke utsettes for hardt arbeide før det er oppnådd full immunitet.

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med preparatet.

Drektighet/Laktasjon: Drektighet: Det foreligger begrensede data der tisper ble vaksinert med en dose Leptodog på dag 10 i drektigheten. Det ble ikke observert noen unormale forhold under drektigheten eller med valpene. Bruk under drektighet kun i henhold til en nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Laktasjon: Bruk under laktasjon kun i henhold til en nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering: Administreres s.c. Grunnvaksinasjon: To injeksjoner gitt med 3–5 ukers mellomrom. Valper skal være minst 7 uker gamle ved første vaksinasjon. Andre vaksinasjon gis fra 12 ukers alder. Revaksinasjon: Årlig revaksinasjon med en dose. Ved høyt smittepress kan revaksinasjon hver 6. måned være nødvendig.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger: Hettegl.: 10 × 1 ml.