

# Nobivac® Pi vet.



## Vaksine mot parainflensa hos hund.

### **PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:**

Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Parainflensavirus (CPIV), levende svekket stamme Cornell  $\geq 10^{5,5}$  og  $\leq 10^{7,3}$  TCID<sub>50</sub>. Kan inneholde spor av antibiotika (neomycin, polymyxin B, gentamycin eller amfotericin B). II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.

### **Egenskaper:**

*Virkningsmekanisme:* Antistoffrespons, reduksjon av kliniske symptomer og/eller reduksjon av virusutskillelse er observert etter smitteforsøk med CPIV 4 uker etter vaksinasjon. Varigheten av immunitet er ikke vist, men en sekundær respons er sett hos revaksinerte hunder 1 år etter grunnimmunisering.

### **Indikasjoner:**

Til aktiv immunisering av hunder >8 uker for å redusere kliniske symptomer på infeksjon med hundens parainflensavirus og redusere virusspredning.

### **Bivirkninger:**

Enkelte hunder kan vise ubehag under injeksjon. En diffus hevelse inntil 5 mm i diameter kan forekomme på injeksjonsstedet. Hevelsen kan være hard og smertefull og vare i inntil 3 dager etter injeksjon. Etter subkutan administrering sammen med Nobivac rabies- og/eller lepto-vaksiner kan det observeres en diffus hevelse på injeksjonsstedet hos de fleste valper. Av og til vil denne hevelsen være hard og smertefull, men avtar gradvis og forsvinner etter 2-3 uker.

### **Forsiktighetsregler:**

Kun friske dyr skal vaksineres.

### **Interaksjoner:**

Det foreligger ingen informasjon om samtidig bruk med andre vaksiner bortsett fra lepto- og/eller rabies-vaksiner i Nobivac-serien. Disse flytende vaksinerne kan benyttes til å rekonstituere den frysetørrede Nobivac Pi vet. Det anbefales at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før eller 14 dager etter vaksinasjon med Nobivac Pi vet.

### **Drektighet/Laktasjon:**

Kan brukes til drektige tisper som før drektigheten er vaksinert med Nobivac Pi vet.

### **Dosering:**

1 dose tilsvare 1 ml av den oppløste vaksinen. Injiseres subkutan. *Grunnvaksinering:* **Før 12 uker:** 2 vaksinasjoner, hver med en enkelt dose. 1. dose fra 8 ukers alder og 2. dose 2-4 uker senere. **12 uker og eldre:** Enkel vaksinasjon med 1 dose pr. dyr. *Revaksinering:* 1 enkel dose hvert år.

### **Oppbevaring og holdbarhet:**

Oppbevares kaldt (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter oppløsning: 30 minutter.

### **Andre opplysninger:**

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel eller som godkjent av relevant myndighet.

### **Pakninger:**

5 sett, 25 sett.