

Nobivac® Lepto vet.

Vaksine mot leptospirose hos hund.

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

1 dose (1 ml) inneholdt: Inaktivert *Leptospira interrogans*, serogruppe Canicola; serovar portland-vere, stamme Ca-12-000 ≥ 40 hamster PD₈₀, serogruppe Icterohaemorrhagiae; serovar copenhageni, stamme 820K ≥ 40 hamster PD₈₀.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Vaksinen stimulerer til aktiv immunitet i hunder via humorale antistoffer mot *Leptospira interrogans* serovar canicola og icterohaemorrhagiae. Reduserer kliniske symptomer (feber, dødelighet) og reduserer antall dyr med bakteriemi og leptospiuri etter infeksjon. Begynnende immunitet etter 4 uker. Immuniteten varer i 1 år mot serovar canicola og 6 måneder mot serovar icterohaemorrhagiae.

Indikasjoner:

Aktiv immunisering av hunder (fra 8 ukers alder) for å redusere leptospirose forårsaket av *Leptospira interrogans* serovar canicola og serovar icterohaemorrhagiae.

Bivirkninger:

Noen hunder kan vise ubehag under injeksjonen. En diffus hevelse, inntil 5 mm i diameter, kan sees på injeksjonsstedet i inntil 4 dager. Hevelsen kan være hard og smertefull, men den vil gradvis avta og forsvinner etter 2-3 uker. Anafylaktisk reaksjon kan forekomme.

Interaksjoner:

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner, unntatt Nobivac Rabies (stamme Pasteur RIV) eller vaksiner i Nobivac serien som inneholder DHPPi (valpesyke, hepatitt, parvo og/eller parainfluenza) viruskomponenter. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner enn én av disse gis i perioden 14 dager før til 14 dager etter vaksinasjon med Nobivac Lepto vet.

Direktighet/Laktasjon:

Kan brukes under direktighet.

Dosering:

1 dose er 1 ml. Injiseres subkutant. Vaksinen skal ha værelsestemperatur før bruk. *Grunnimmunisering:* Uvaksinerte hunder skal vaksineres 2 ganger med 2-4 ukers mellomrom. Valper skal være minst 8 uker gamle ved første vaksinasjon. *Revaksinering:* 1 enkeltdose hver 6.-12. måned. Et revaksinasjonsintervall på 6 måneder anbefales for å oppnå beskyttelse mot klinisk leptospirose forårsaket av serovar icterohaemorrhagiae.

Oppbevaring og holdbarhet:

Oppbevares kaldt (2–8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakninger:

10 x 1 ml.