

Rabisin vet.

Vaksine mot rabies.

INJEKSIONSVÆSKE, suspensjon: Hver dose (1 ml) inneh.: Inaktivert rabiesvirus, stamme G52 >1 IE, aluminiumhydroksid 1,7 mg, tiomersal <0,1 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.

Egenskaper: Klassifisering: Inaktivert virusvaksine. Virkningsmekanisme: Immunitet er ferdigutviklet etter 2-3 uker.

Indikasjoner: For aktiv immunisering av hund, katt, hest, storfe og sau mot rabies.

Kontraindikasjoner: Må ikke injiseres s.c. på hest.

Bivirkninger: Overfølsomhetsreaksjon er sjeldent og passende symptomatisk behandling skal da iverksettes. Injeksjon av vaksinen kan i enkelte tilfeller forårsake en mindre og forbigående hevelse på injeksjonsstedet.

Forsiktighetsregler: Kun friske dyr bør vaksineres. Dyret bør ikke utsettes for hardt fysisk anstrengelse før det er oppnådd full immunitet.

Interaksjoner: Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med preparatet.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering: Vaksinen ristes før bruk. Hund og katt: Administreres s.c. eller i.m. Storfe og sau: Administreres s.c. Hest: Må kun injiseres i.m. Grunnvaksinasjon: Hund og katt: 1 dose fra 3 måneders alder. For å skulle tilfredsstille Mattilsynets krav til minimum antistofftiter for innførsel, anbefales 2 injeksjoner gitt med 3-4 ukers mellomrom. Hest, storfe og sau: 1 dose fra 2 måneders alder. Individuer født av immuniserte mordyr vaksineres fra 6 måneders alder. Revaksinasjon: Samtlige dyreslag revaksineres med 1 dose årlig.

Tilbakeholdelsestider: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i ytteremballasjen. Må ikke fryses.

Pakninger: Ferdigfylte sprøyter: 1 × 1 ml, 10 × 1 ml.