

Fel-O-Vax IV vet.

Vaksine mot kattepest, rhinotrakeittvirus, calicivirus og klamydiainfeksjon hos katt (inaktivert).

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: Hver sprøyte inneh.: Felint panleukopenivirus, CU4 (kattepestvirus) inaktivert, 105,6 TCID50, felint rhinotrakeittvirus, 605 (felint herpesvirus-1) inaktivert, 107,8 TCID50, felint calicivirus, 255 inaktivert, 108,0 TCID50, Chlamydia psittaci bakterin, cello, 105,1 TCID50, etylenmaleatanhydrid (EMA) 10 mg, Neokryl XK-62 30 mg, Emulsigen SA 50 mg.

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Stimulerer utviklingen av aktiv immunitet mot felint panleukopenivirus, felint rhinotrakeittvirus, felint calicivirus og felin Chlamydia psittaci.

Indikasjoner: Aktiv immunisering av katter mot kattepest, rhinotrakeitt, calicivirusinfeksjon og infeksjon med Chlamydia psittaci.

Kontraindikasjoner: Syke og påkjente dyr skal ikke vaksineres.

Bivirkninger: Hevelse, smerte, kløe og håravfall på injeksjonsstedet sees av og til, likeledes feber, oppkast, anoreksi og/eller slapphet. Forsvinner vanligvis innen 24 timer. I sjeldne tilfeller kan alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner og sjokk opptre i løpet av de første timene etter vaksinasjon. Behandles med adrenalin og støttebehandling.

Forsiktighetsregler: Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp.

Interaksjoner: Andre vaksiner anbefales ikke gitt 14 dager før til 14 dager etter vaksinerings.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes til drektige og diegivende katter.

Dosering: 1 dose tilsvarer 1 sprøyte. Gis subkutant. Grunnimmunisering: 1 injeksjon mot kattepest, 2 injeksjoner med 3-4 ukers mellomrom mot rhinotrakeitt, calicivirus og Chlamydia psittaci. Første dose vanligvis ved 12 ukers alder. Ved stort smittepress ned til 6 ukers alder. Ved 1. dose før 12 ukers alder, anbefales revaksinasjon etter ca. 4 og 8 uker. Revaksinerings: 1 dose årlig.

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt (2-8°C).

Pakninger: 25 doser.