

LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, emulsjon.

INNHold (DEKLARASJON)

5000 doser à 0,1 ml per 500 ml flaske.
Virkestoff: Formalininaktiverte stammer av *Aeromonas salmonicida* subsp. *salmonicida*, *Vibrio salmonicida*, *Vibrio anguillarum* serovar O1 og O2, *Vibrio viscosus* og et overflateprotein fra IPNV serovar Sp.

Adjuvans: Animalsk/vegetabilsk olje.

LEGEMIDDELGRUPPE

Vaksine til fisk.

BRUKSOMRÅDE (INDIKASJONER)

Forebyggende mot furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose, vintersår (forårsaket av *Vibrio viscosus*) og infeksjøs pankreasnekrose hos laks.

DYREART SOM LEGEMIDLET KAN BRUKES TIL

Atlantisk laks (*Salmo salar*).

TILSTANDER SOM GJØR AT LEGEMIDLET IKKE SKAL BRUKES (KONTRAIKASJONER)

Ingen.

FORSIKTIGHETSREGLER

Anbefalt fiskestørrelse er minimum 35 gram ved vaksinerings. Det er viktig med nøyaktig plassering av injeksjonssted og at det benyttes riktig tilpasset vaksinasjonsutstyr i forhold til fiskens størrelse (se bruksanvisning). Påse at hele vaksinedosen deponeres i bukhulen før kanylen trekkes ut.

TILBAKEHOLDELSESTID

0 dager.

DOSERING

0,1 ml vaksine injiseres per fisk.

BRUKSANVISNING

Fisken sultes i 1-2 døgn før vaksinerings. Fisken bedøves etter anvisning fra veterinær. Den vaksineres ved injeksjon av 0,1 ml vaksine i bukhulen (i midtlinjen) ca. 1-1,5 finnelengde foran bukfinnernes feste. Injeksjon anbefales utført med kanyle med diameter 0,6±0,1 mm. Ryst flasken godt før bruk. Det anbefales minimum 500 døgngader fra fisken vaksineres til den forventes utsatt for smitte.

BIVIRKNINGER

Redusert appetitt kan observeres i den første tiden etter vaksinerings. Lokale betennelsesreaksjoner i bukhulen kan gi sammenvoksninger og/eller pigmentflekker. Eventuelle avvikende bivirkninger bør rapporteres til veterinær.

OVERDOSERING

Doser på opptil 2x anbefalt dose har i forsøk ikke gitt uakseptable effekter.

OPPBEVARING OG HOLDBARHET

Oppbevares kaldt (+2-+8 °C). Må ikke utsettes for frost. Åpnede flasker brukes innen 12 timer, restinnholdet kasseres. Uåpnede flasker er holdbare t.o.m. den måneden som er angitt på pakningen.

AVFALLSHÅNDTERING

Ubrukt vaksine og rester kan leveres på apotek.

SPESIELLE ANMERKNINGER

Verneutstyr (kanylebøyle, hansker) bør benyttes ved håndvaksinerings. Utisiktet injeksjon av vaksine på menneske kan forårsake smerte, hevelse og/eller anafylaktiske/allergiske reaksjoner. Kontakt lege ved vaksinasjonsuhell, og informer om at vaksinen er en vann i olje emulsjon. Den lokale legetjenesten bør varsles før vaksinerings av fisk igangsettes.

SPESIELLE ADVARSLER

Syk fisk skal ikke vaksineres.

NORSK REPRESENTANT (1) OG TILVIRKER (2)

(1) Intervet Norbio AS,
Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen, Norge.
Tlf: 55 54 37 50 / Faks: 55 96 01 35.

(2) Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, 5830 AA Boxmeer,
Nederland.

Vaksinen er tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
KUN TIL VETERINÆRT BRUK.

Pakningsvedlegget er revidert per august 2002