

LEGEMIDDELFORM

Suspensjon til injeksjon og immersjon (dypp).

INNHold (DEKLARASJON)

Ved injeksjon: 5000 doser à 0,1 ml per 500 ml flaske. Ved immersjon: 50 kg fisk kan vaksineres per 500 ml flaske.

Virkestoff: Formalinaktiverte stammer av *Vibrio anguillarum* serovar O1 og O2.

LEGEMIDDELGRUPPE

Vaksine til fisk.

BRUKSOMRÅDE (INDIKASJONER)

Forebyggende mot vibriose hos laks og regnbueørret.

DYREART SOM LEGEMIDLET KAN BRUKES TIL

Atlantisk laks (*Salmo salar*) og regnbueørret (*Oncorhynchus mykiss*).

TILSTANDER SOM GJØR AT LEGEMIDLET IKKE SKAL BRUKES (KONTRAIKASJONER)

Ingen.

FORSIKTIGHETSREGLER

Anbefalt fiskestørrelse er minimum 25 gram ved injeksjon og 5-10 gram ved immersjon. Ved injeksjon av preparatet er det viktig med nøyaktig plassering av injeksjonssted og at det benyttes riktig tilpasset vaksinasjonsutstyr i forhold til fiskens størrelse (se bruksanvisning). Påse at hele vaksinedosen deponeres i bukhulen før kanylen trekkes ut.

TILBAKEHOLDELSESTID

0 dager.

DOSERING

Ved injeksjon: 0,1 ml vaksine injiseres per fisk. Ved immersjon: Dypp inntil 3 kg fisk i vaksineløsningen (se bruksanvisning) i 30 sekunder ved hjelp av en hov.

BRUKSANVISNING

Fisken sultes i 1-2 døgn før vaksinerings. Fisken bedøves etter anvisning fra veterinær. Ved injeksjon: Fisken vaksineres ved injeksjon av 0,1 ml vaksine i bukhulen (i midtlinjen) ca. 1-1,5 finnelengde foran bukfinnens feste. Injeksjon anbefales utført med kanyle med diameter 0,6±0,1 mm.

Ved immersjon: 0,5 liter vaksine blandes med 4,5 liter vann (vaksineløsning). Inntil 50 kg fisk kan vaksineres før ny vaksineløsning må lages. Ryst flasken godt før bruk. Det anbefales minimum 500 døgngrader fra fisken vaksineres til den forventes utsatt for smitte.

BIVIRKNINGER

Redusert appetitt kan observeres i den første tiden etter vaksinerings. Betennelsesreaksjoner ved injeksjonsstedet kan forekomme. Eventuelle avvikende bivirkninger bør rapporteres til veterinær.

OVERDOSERING

Doser på opptil 2x anbefalt dose har i forsøk ikke gitt uakseptable effekter.

OPPBEVARING OG HOLDBARHET

Oppbevares kaldt (+2-+8 °C). Må ikke utsettes for frost. Åpnede flasker brukes innen 12 timer, restinnholdet kasseres. Uåpnede flasker er holdbare t.o.m. den måneden som er angitt på pakningen.

AVFALLSHÅNDTERING

Ubrukt vaksine og rester kan leveres på apotek.

SPESIELLE ANMERKNINGER

Verneutstyr (kanylebøyle, hansker) bør benyttes ved håndvaksinerings. Utisiktet injeksjon av vaksine på menneske kan forårsake smerte, hevelse og/eller anafylaktiske/allergiske reaksjoner. Kontakt lege ved vaksinasjonsuhell. Den lokale legetjenesten bør varsles før vaksinerings av fisk igangsettes.

SPESIELLE ADVARSLER

Syk fisk skal ikke vaksineres.

NORSK REPRESENTANT (1) OG TILVIRKER (2)

(1) Intervet Norbio AS,
Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen, Norge.
Tlf: 55 54 37 50 / Faks: 55 96 01 35.

(2) Intervet International B.V.,
Wim de Körverstraat 35, 5830 AA Boxmeer,
Nederland.

Vaksinen er tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
KUN TIL VETERINÆRT BRUK.

Pakningsvedlegget er revidert per november 2002